
TD n°2: Suites de nombres réels

Exercice 1. Écrire à l'aide de quantificateurs les propriétés suivantes :

- a) La suite u est positive à partir d'un certain rang.
- b) La suite u est constante à partir d'un certain rang. Comment s'appelle une telle suite ?
- c) La suite u est croissante à partir d'un certain rang.

Exercice 2. Une suite arithmétique de raison r est-elle croissante? décroissante? constante?
Mêmes questions pour une suite géométrique de raison r .

Exercice 3. Soient u et v deux suites bornées et $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrer que $u + v$ et λu sont bornées.

Exercice 4. Montrer qu'une suite u est majorée, resp. minorée, si et seulement si elle est majorée, resp. minorée, à partir d'un certain rang.

Exercice 5. Une suite arithmétique de raison r est-elle majorée? minorée? bornée?
Mêmes questions pour une suite géométrique de raison r .

Exercice 6. Donner un exemple de suite:

- a) Croissante et majorée.
- b) Ni croissante, ni décroissante.
- c) Ni majorée, ni minorée.
- d) Croissante, ni strictement croissante à partir d'un certain rang ni stationnaire.

Exercice 7. Écrire la définition de "la suite u est divergente".

Exercice 8. Montrer que la suite de terme général $u_n = \frac{3n-1}{2n+3}$ tend vers $3/2$ en utilisant la définition.

Exercice 9. Montrer en utilisant la définition que si, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$ et $u_n \rightarrow a$, alors $a \geq 0$ et $\sqrt{u_n} \rightarrow \sqrt{a}$.

Exercice 10. Montrer en utilisant la définition que $(\sqrt{n})_n$ tend vers $+\infty$.

Exercice 11. Étudier la convergence des suites de termes généraux suivantes.

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| a) $(-1)^n \frac{n+1}{n}$ | g) $\frac{n}{2} \sin \frac{n\pi}{2}$ | l) $\frac{\sqrt{n}-1}{\sqrt{n}+1}$, |
| b) $\frac{n}{n+1}$ | h) $\frac{\sin^2 n - \cos^3 n}{n}$ | m) ne^{-n} , |
| c) $\frac{1}{n^2+1}$ | i) $\sin\left(\frac{2n\pi}{3}\right)$ | n) $\frac{2^n - 3^{n+1}}{5^{2n}}$, |
| d) $\frac{n}{n^2+1}$ | j) $\frac{E(nx)}{n}$, $x \in \mathbb{R}$, | o) $\ln\left(\frac{1+n}{n^2}\right)$, |
| e) $n - \sqrt{n^2 - n}$ | k) $\frac{\cos(n\theta)}{n}$, | p) $\frac{n^2 + (-1)^n \sqrt{n}}{2n+1}$. |
| f) $\sqrt{n(n+1)} - n$, | | |

Rappel : $\sin(k\pi) = 0, \forall k \in \mathbb{N}$; $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$.

Exercice 12. Montrer que si pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_n > 0$ et si $u_n \rightarrow 0$ alors $\frac{1}{u_n} \rightarrow +\infty$.

Exercice 13. Soient u_0 et v_0 deux réels tels que $u_0 < v_0$. On définit les suites u et v par $u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$ et $v_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3}$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < u_{n+1} < v_{n+1} < v_n$. En déduire que ces deux suites convergent et ont la même limite.

Exercice 14. Montrer que

$$\bigcap_{n \geq 1} \left[1 - \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n} \right] = [1, 2].$$

Exercice 15. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$u_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n + \sqrt{1}} + \cdots + \frac{1}{n + \sqrt{n}}.$$

Montrer que la suite u est convergente et calculer sa limite. (Indication : trouver un encadrement et utiliser le théorème des gendarmes.)

Exercice 16. Soit $u_n = \prod_{k=1}^n \cos \frac{1}{2^k} = \cos \frac{1}{2} \times \cdots \times \cos \frac{1}{2^n}$. Etudier la convergence de cette suite et calculer sa limite éventuelle. (Indication : utiliser la relation $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$.)

Exercice 17. Soient a et b les suites définies par $0 < a_0 < b_0$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$ et $b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$.

- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $0 < a_n < b_n$.
- Montrer que a est croissante et b est décroissante.
- En déduire que les suites a et b convergent.
- Montrer que les suites a et b ont même limite.

Exercice 18. Soit A et B deux parties non vides majorées de \mathbb{R} . Montrer que $A \subset B \implies \sup A \leq \sup B$.

Exercice 19. Si A et B sont deux parties de \mathbb{R} , on définit $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$.

- Soient $A = [0, 1[$ et $B = \{1\}$. Déterminer $A \cup B$ et $A + B$.
- On suppose que A et B admettent chacun un plus grand élément. Montrer que $A + B$ admet un plus grand élément et que $\max(A + B) = \max A + \max B$.
On suppose que A et B sont majorées.
- Montrer que $A \cup B$ et $A + B$ sont majorées.
- Montrer que $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.
- Déterminer $\sup(A \cup B)$.
- Est-ce que $\sup(A \cap B) = \min(\sup A, \sup B)$?

Exercice 20. Soit $A = \left\{ \frac{1 + \cos n}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

- Soit u la suite de terme général $\frac{1 + \cos n}{n}$, $n \geq 1$. Est-elle convergente ? Si oui, quelle est sa limite ?
- Montrer que A admet un max.
- Calculer $\inf A$. A admet-il un min ?

Exercice 21. Pour chacune des affirmations suivantes dire si elle est vraie ou fausse. (Justifier la réponse.)

- Une suite convergente dont tous les termes sont des entiers est constante à partir d'un certain rang.
- Si pour tout $p \in \mathbb{N}$, u_{2p} est positif et u_{2p+1} est négatif, alors la suite u diverge.
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} nu_n = 1$ alors la suite u converge.
- Si la suite $(nu_n)_n$ est bornée alors la suite u converge.
- Si u est croissante, alors u tend vers $+\infty$.
- Une suite non majorée tend vers $+\infty$.
- Si $u_n \rightarrow \frac{1}{2}$ alors la suite u est positive partir d'un certain rang.
- Toute suite monotone est convergente.
- Toute suite croissante et majorée est bornée.
- Si la suite u est décroissante et $\forall n \in \mathbb{N} u_n \geq 0$, alors $u_n \rightarrow 0$.
- Une suite à termes positifs qui converge vers 0 est décroissante à partir d'un certain rang.
- Si $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n < v_n$ et $v_n \rightarrow 0$ alors $u_n \rightarrow 0$.
- Si la suite $u_n \rightarrow l$ alors $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$.
- Si la suite $(|u_n|)_n$ converge alors la suite $(u_n)_n$ converge.

- o) Si les suites u et v divergent alors la suite $u + v$ diverge.
 p) Si les suites u et v divergent alors la suite uv diverge.
 q) Si la suite u converge et la suite v diverge alors la suite $u + v$ diverge.
 r) Si la suite u converge et la suite v diverge alors la suite uv diverge.
 s) Pour toute suite v , si $u_n \rightarrow 0$ alors $u_n v_n \rightarrow 0$.
 t) Si $u_n v_n \rightarrow 0$ alors soit $u_n \rightarrow 0$ soit $v_n \rightarrow 0$. (*Indication*: considérer l'exemple $u_n = (1 + (-1)^n)/2$, $v_n = (1 - (-1)^n)/2$.)
 u) Si $u_n \rightarrow l$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ alors $l > 0$.
 v) Si u est une suite croissante et $\forall n \in \mathbb{N}$ $u_n \leq 7$ alors $u_n \rightarrow 7$.
 w) On ne modifie pas le fait qu'une suite converge ou diverge en modifiant un nombre fini de ses termes.

Exercice 22. Soit a_n une suite de réels positifs telle que :

$$\forall m \in \mathbb{N}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad a_{m+n} \leq a_m + a_n.$$

- a) Soit $p \in \mathbb{N}^*$, montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{np} \leq na_p$.
 On rappelle que pour deux entiers naturels non nuls n et p quelconques, il existe deux entiers naturels q et r tels que $n = pq + r$ et $0 \leq r < p$.

b) Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \forall p \in \mathbb{N}^*, \quad \exists q \in \mathbb{N}, \quad \exists r \in \{0, \dots, p-1\}, \quad a_n \leq qa_p + a_r.$$

c) En déduire que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \forall p \in \mathbb{N}^*, \quad \exists r \in \{0, \dots, p-1\}, \quad \frac{a_n}{n} \leq \frac{a_p}{p} + \frac{a_r}{n},$$

et donc que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \forall p \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{a_n}{n} \leq \frac{a_p}{p} + \frac{\max\{a_0, \dots, a_{p-1}\}}{n}.$$

- d) Justifier que l'ensemble $\left\{ \frac{a_k}{k} \mid k \in \mathbb{N}^* \right\}$ admet une borne inférieure qu'on notera λ .
 Dans les deux questions qui suivent, ε désigne un réel strictement positif fixé.

e) Montrer qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{a_p}{p} < \lambda + \frac{\varepsilon}{2}$.

f) En déduire que, pour ce p , on a

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \lambda \leq \frac{a_n}{n} < \lambda + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\max\{a_0, \dots, a_{p-1}\}}{n}.$$

g) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n} = \lambda$.

Exercice 23. Montrer que si une suite u a ses deux suites extraites $(u_{2n})_n$ et $(u_{2n+1})_n$ qui convergent et ont la même limite l alors la suite u converge vers l .

Exercice 24. Soit $(u_n)_n$ une suite telle que les suites extraites $(u_{2n})_n$, $(u_{2n+1})_n$ et $(u_{3n})_n$ convergent. Montrer que $(u_n)_n$ converge. (*Indication* : faire intervenir les suites extraites $(u_{6n})_n$ et $(u_{6n+3})_n$.)

Exercice 25. Soit $(u_n)_n$ une suite convergente vers l . Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = \frac{1}{n+1} \sum_{p=0}^n u_p$ (v est la moyenne de Césaro de u). Montrer que la suite v converge vers l .

Indications : traduire la convergence de la suite u_n vers l : " $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \dots$ ", puis découper la somme qui définit v_n avec l'entier n_0 introduit dans la définition en deux sommes et enfin étudier la limite de chacune des 2 sommes.

Exercice 26. Soit $A \subset \mathbb{R}$. On rappelle que A est *dense* dans \mathbb{R} si pour tous x, y dans \mathbb{R} avec $x < y$ il existe $a \in A$ tel que $x < a < y$. Montrer qu'un ensemble A est dense si et seulement si tout élément de \mathbb{R} est la limite d'une suite d'éléments de A , c'est-à-dire pour tout $x \in \mathbb{R}$ il existe une suite $(a_n)_n \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $a_n \rightarrow x$.